

山形県立河北病院 化学療法レジメン一覧

【大腸がん】

2020.5.1

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性 リスク
mFOLFOX6 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
mFOLFOX6+アパスタチン 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
	アパスタチン	5mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1	
mFOLFOX6+ヘクティビックス 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
	ヘクティビックス	6mg/kg	点滴静注 1時間/D1	
mFOLFOX6+アービタックス 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	点滴静注 1時間(初回2時間)/D1, 8	
FOLFIRI 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	イリリテカン	150mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
FOLFIRI+アパスタチン 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	イリリテカン	150mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
	アパスタチン	5mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1	
FOLFIRI+ヘクティビックス 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	イリリテカン	150mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
	ヘクティビックス	6mg/kg	点滴静注 1時間/D1	
FOLFIRI+ザルトラップ 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	イリリテカン	150mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
	ザルトラップ	4mg/kg	点滴静注 1時間/D1	
FOLFIRI+ラムシルマフ 2週/コース	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	イリリテカン	150mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
	ラムシルマフ	8mg/kg	点滴静注 1時間/D1	
SOX 3週/コース	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
SOX+アパスタチン 3週/コース	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	アパスタチン	7.5mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1	
XELOX 3週/コース	ゼローダ	2000mg/m ²	内服/D1-14	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
XELOX+アパスタチン 3週/コース	ゼローダ	2000mg/m ²	内服/D1-14	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	アパスタチン	7.5mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1	

IRIS 4週/コース	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	中等度
	イリノテカン	125mg/m ²	点滴静注 1時間30分/D1, 15	
IRIS+アパチン 4週/コース	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	中等度
	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注 1時間30分/D1, 15	
	アパチン	5mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1, 15	
SIRB 3週/コース	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 1時間30分/D1	
	アパチン	7.5mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1	
イリノテカン+アビタックス 7週/コース	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注 2時間/D1, 15, 29	中等度
	アビタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	点滴静注 1時間(初回2時間)/D1~毎週	
アビタックス 4週/コース	アビタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	点滴静注 1時間(初回2時間)/D1, 8, 15, 22	最小度
ベクティビックス 2週/コース	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注 1時間/D1	最小度
UFT+LV+アパチン 4週/コース	ユーエフティ	300mg/m ²	内服/D1-21	最小度
	ユーセル	75mg/b	内服/D1-21	
	アパチン	5mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1, D15	

【乳がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
CMF 4週/コース	エントキサン	100mg/b	内服/D1-14	中等度
	メトトレキサート	40mg/m ²	点滴静注 15分/D1, 8	
	5-FU	500mg/m ²	点滴静注 2時間/D1, 8	
FEC 3週/コース	5-FU	500mg/m ²	点滴静注 15分/D1	高度
	エピルビン	100mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	エントキサン	500mg/m ²	点滴静注 30分/D1	
CEF 4週/コース	5-FU	500mg/m ²	点滴静注 2時間/D1, 8	高度
	エピルビン	60mg/m ²	点滴静注 15分/D1, 8	
	エントキサン	100mg/b	内服/D1-14	
EC 3週/コース	エピルビン	100mg/m ²	点滴静注 15分/D1	高度
	エントキサン	600mg/m ²	点滴静注 30分/D1	
TC 3週/コース	トセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	中等度
	エントキサン	600mg/m ²	点滴静注 30分/D1	
トセタキセル 3週/コース	トセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	軽度
Weeklyハクリタキセル 4週/コース	ハクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間/D1, 8, 15	軽度
Weeklyハクリタキセル+アパチン 4週/コース	ハクリタキセル	90mg/m ²	点滴静注 1時間/D1, 8, 15	軽度
	アパチン	10mg/m ²	点滴静注 1時間30分/D1, 15	
Weeklyアブラキサン 4週/コース	アブラキサン	100mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	軽度
トラスツスマブ(毎週)	トラスツスマブ	2mg/kg(初回4mg/kg)	点滴静注 1時間30分/毎週	最小度
トラスツスマブ(3週毎) 3週/コース	トラスツスマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	点滴静注 1時間30分/D1	最小度
トラスツスマブ+ハクリタキセル 4週/コース	トラスツスマブ	2mg/kg(初回4mg/kg)	点滴静注 1時間30分/毎週	軽度
	ハクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間/D1, 8, 15	
トラスツスマブ+トセタキセル 3週/コース	トラスツスマブ	2mg/kg(初回4mg/kg)	点滴静注 1時間30分/毎週	軽度
	トセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	
トラスツスマブ+VNB 3週/コース	トラスツスマブ	2mg/kg(初回4mg/kg)	点滴静注 1時間30分/毎週	最小度
	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 15分/D1, 8	
VNB 3週/コース	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 15分/D1, 8	最小度
ハーシエタ+トラスツスマブ+VNB 3週/コース	ハーシエタ	420mg/b(初回840mg/b)	点滴静注 1時間/D1	最小度
	トラスツスマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	点滴静注 1時間30分/D1	
	ビノレルビン	25mg/m ²	点滴静注 15分/D1, 8	
ハーシエタ+トラスツスマブ+トセタキセル 3週/コース	ハーシエタ	420mg/b(初回840mg/b)	点滴静注 1時間/D1	軽度
	トラスツスマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	点滴静注 1時間30分/D1	
	トセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	
ゲムシタビン 3週/コース	ゲムシタビン	1250mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8	軽度
ハラウエン 3週/コース	ハラウエン	1.4mg/m ²	点滴静注 15分/D1, 8	軽度
カトサイラ 3週/コース	カトサイラ	3.6mg/kg	点滴静注 1時間30分/D1	軽度

【胃がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
S-1+シスプラチン 5週/コース	S-1	80mg/m ²	内服/D1-21	高度
	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間/D8	
SP+トラスツスマブ 5週/コース	S-1	80mg/m ²	内服/D1-21	高度
	シスプラチン	60mg/m ²	点滴静注 2時間/D8	
	トラスツスマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	点滴静注 1時間30分/D1, 3週毎	
XP 3週/コース	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	高度
	ゼローダ	2000mg/m ²	内服/D1-14	
XP+トラスツスマブ 3週/コース	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	高度
	ゼローダ	2000mg/m ²	内服/D1-14	
	トラスツスマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	点滴静注 1時間30分/D1	
SOX 3週/コース	オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	
XELOX+トラスツスマブ 3週/コース	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
	ゼローダ	2000mg/m ²	内服/D1-14	
	トラスツスマブ	6mg/kg(初回8mg/kg)	点滴静注 1時間30分/D1	
イリリテカン+シスプラチン 4週/コース	イリリテカン	60mg/m ²	点滴静注 1時間30分/D1, 15	高度
	シスプラチン	30mg/m ²	点滴静注 2時間/D1, 15	
Weeklyパクリタキセル 4週/コース	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間/D1, 8, 15	軽度
トセタキセル 3週/コース	トセタキセル	60mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	軽度
S-1+トセタキセル 3週/コース	トセタキセル	40mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	軽度
	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	
イリリテカン 2週/コース	イリリテカン	150mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	中等度
アプラキサン 3週/コース	アプラキサン	260mg/m ²	点滴静注 30分/D1	軽度
Weeklyアプラキサン 4週/コース	アプラキサン	100mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	軽度
ラムシルマブ 2週/コース	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注 1時間/D1	最小度
ラムシルマブ/パクリタキセル 4週/コース	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注 1時間/D1, 15	軽度
	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間/D1, 8, 15	

【血液がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
CHOP 3~4週/コース	エントキサン	750mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	高度
	トキソリビシン	50mg/m ²	点滴静注 30分/D1	
	オンコビン	1.4mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	プレドニゾロン	50mg/m ²	点滴静注30分または内服/D1-5	
リツキシマブ	リツキシマブ	375mg/m ²	点滴静注 4時間/D1	最小度
ABVd 4週/コース	トキソリビシン	25mg/m ²	点滴静注 30分/D1	高度
	フレオ	10mg/m ²	点滴静注 30分/D1	
	エクスール	6mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	ダカルバジン	250mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	
ABVD 4週/コース	トキソリビシン	25mg/m ²	点滴静注 30分/D1	高度
	フレオ	10mg/m ²	点滴静注 30分/D1	
	エクスール	6mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	ダカルバジン	375mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	
ゲムシタビン 4週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	軽度
ビターザ(静注) 4週/コース	ビターザ	75mg/m ²	点滴静注 10分/D1-5, 8-9	中等度
ビターザ(皮下注) 4週/コース	ビターザ	75mg/m ²	皮下注/D1-7	中等度

【膵臓がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
ゲムシタビン 4週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	軽度
FOLFIRINOX 2週/コース	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	高度
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	イリリテカン	180mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注 15分/D1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注 46時間/D1	
ゲムシタビン+アブラキサン 4週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	中等度
	アブラキサン	125mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	

【胆道がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
ゲムシタビン 4週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	軽度
S-1+ゲムシタビン 3週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8	中等度
	S-1	80mg/m ²	内服/D1-14	
ゲムシタビン+シスプラチン 3週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8	中等度
	シスプラチン	25mg/m ²	点滴静注 1時間/D1, 8	

【食道がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
FP 4週/コース	5-FU	800mg/m ²	点滴静注 24時間/D1-5	高度
	シスプラチン	80mg/m ²	点滴静注 2時間/D1	
ドセタキセル 3週/コース	ドセタキセル	70mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	軽度

【泌尿器科がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
ドセタキセル 3週/コース	ドセタキセル	75mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	軽度
ゲムシタビン+シスプラチン 4週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	高度
	シスプラチン	70mg/m ²	点滴静注 3時間/D2	
ゲムシタビン+カルホプラチン 4週/コース	ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴静注 30分/D1, 8, 15	中等度
	カルホプラチン	AUC5	点滴静注 1時間/D1	

【頭頸部がん】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法/投与日	催吐性リスク
アービタックス 4週/コース(毎週)	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	点滴静注 1時間(初回2時間)/D1, 8, 15, 22	最小度
アービタックス+ハクリタキセル 1週/コース	アービタックス	250mg/m ² (初回400mg/m ²)	点滴静注 1時間(初回2時間)/D1	軽度
	ハクリタキセル	80mg/m ²	点滴静注 1時間/D1	